

Nº REGISTRO SENASA: 5086

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**

OLEOVAC HCI-NW-LT, es una vacuna inactivada oleosa para aves.

**PRESENTACION:**

Frascos de 0.5 L.

**COMPOSICION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:**

<b>Sustancia activa:</b>	Virus de HCI, Virus de Newcastle cepa La Sota, Laringotraqueítis, <i>Avibacterium paragallinarum</i> (Coriza Infecciosa)
<b>Cada dosis contiene:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Adenovirus I (4, 8 y 11): <math>\geq 10^{8.0}</math> TCID 50% para cada serotipo.</li> <li>➤ Virus de Newcastle (La Sota): <math>\geq 10^{8.0}</math> TCID 50%.</li> <li>➤ Virus de Laringotraqueitis Infecciosa (CEO): <math>\geq 10^{8.0}</math> TCID 50%.</li> </ul>
<b>Excipiente(s):</b>	No presenta.
<b>Adyuvantes:</b>	Aceite mineral, Canarcel 80, Tween 80

**FORMA FARMACEUTICA:**

Suspensión oleosa.

**INDICACIONES DE USO:****Protección:**

Inducción de anticuerpos frente al virus HCI, virus de Newcastle, virus de Laringotraqueítis Infecciosa

**Precauciones para su uso en animales:**

- Solo deben inmunizarse animales sanos.
- Antes de su uso la vacuna se debe estabilizar a temperatura ambiente (25 °C), y agitar fuertemente antes de aplicar.
- En el caso de vacunaciones múltiples (vivas e inactivadas en el mismo día) los componentes de las vacunas inactivadas pueden inactivar las vacunas vivas por lo que se recomienda vacunar con vacuna viva primero y 2 horas después aplicar vacunas inactivadas.
- Usar instrumental con una adecuada higiene y limpieza
- Verificar la dosificación y efectividad de la vacunación (AVE NO VACUNADA, AVE NO INMUNIZADA).

**POSOLOGIA / ADMINISTRACIÓN:**

Inyección subcutánea (cuello) o intramuscular; 0.1 ml – 0.5 ml, de acuerdo a la edad del ave y según las indicaciones del médico veterinario).

**PERIODO DE VALIDEZ:**

2 años desde la fecha de producción

**PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN:**

- Conservar y transportar refrigerado entre 2°C y 7°C.
- No congelar y proteger de la luz.

**TIEMPO DE RETIRO:**

No aplica.